



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Dana: 08.08.2023
Ref. KM-277/23

Na osnovu člana 145. (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Prilog 11 Uredbe (VRK) -br.02/2021 o oblasti administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20. (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o proizvodima za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008.) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i odobrenje proizvoda za zaštitu bilja, sa Ref. 04-382/23, dana 31.07.2023. godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja donosi:

ODLUKU

Za upis u registar i odobrenje za upotrebu proizvoda za zaštitu bilja

1. Dozvoljava se uvoz, stavljanje na tržište i korišćenje ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja – **Fundamentum 700 WG, proizvođač “Innvigo Sp. z o.o.”, Poljska, od strane predstavnika “Monuni”, SH.P.K, Gnjilane.**

2. **VRSTA PROIZVODA** : Herbicid

3. **SADRŽAJ AKTIVNIH SUBSTANCA:** Tribenuron-methyl.....400g/kg
Metsuluron-methyl.....135g/kg
Florasulam.....165g/kg

4. UPOTREBA:

Fundamentum 700 WG namenjen je za upotrebu sa samopokretnom prskalicom ili prskalicom na traktor.

Ozima pšenica, ozimi tritikale, ozima raž, vreme tretmana: naneti proizvod u fazama od uplitanja prve jasne stabljike do neotvorenog lista zastavice (BBCH 21–39). a) Za individualnu upotrebu

Maksimalna/preporučena doza za jednu primenu: 30 g/ha. Broj tretmana: 1.

a) Koristite u kombinaciji sa vlažnosti, maksimalna/preporučena doza za jednu aplikaciju:

Fundamentum 700 VG 25 g/ha + Asystent + 0,1 l/ha. Broj tretmana: 1. Preporučena količina vode: 200–300 l/ha. Preporučeni sprej: kapljice srednje. Maksimalan broj tretmana tokom vegetacije: 1.

Jara pšenica, jari ječam

Vreme tretmana: naneti proizvod u fazama od zbrajanja - prvog jasnog stabla do drugog čvora (BBCH 21–32).

c) Pojedinačna primena

Maksimalna/preporučena doza za jednu primenu: 30 g/ha.

Broj tretmana: 1

b) Koristite u kombinaciji sa hidrantom

Maksimalna/preporučena doza za jednu aplikaciju:

Fundamentum 700 VG 25 g/ha + Asystent + 0,1 l/ha

Broj tretmana: 1.

Preporučena količina vode: 200–300 l/ha.

Preporučeni sprej: kapljice - srednje.

Ozima pšenica, ozimi tritikale, ozima raž:

	Nekombinovana primena:	Kombinovana upotreba sa vlažnosti:
Osetljivi korovi:	<i>Lithospermum arvense</i> (poljski gromvel), <i>Lamium amplexicaule</i> (obični henbit), <i>Fumaria officinalis</i> (obična dimnjača), <i>Cirsium arvense</i> (Palamia), <i>Matricaria chamomilla</i> (kamomilin), <i>Thlaspi arvense</i> (tlaspin njiva), <i>Papaver rhoeas</i> (Bulka), <i>Centaurea cyanus</i> (Njivski razlićak), <i>Stellaria media</i> (mišjakinja), <i>Lamium purpureum</i> (crvena kopriva) <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Hoću-neću), <i>Brasica napus</i> (Uljana repica), <i>Galium aparine</i> (Brođika), <i>Tripleurospermum inodorum</i> (bezmirisna kamilica), <i>Myosotis arvensis</i> (Sitnocvetni spomenak), <i>Galeopsis tetrahit</i> (smrdljiva kopriva).	<i>Lithospermum arvense</i> (poljski gromvel), <i>Lamium amplexicaule</i> (obični henbit), <i>Fumaria officinalis</i> (obična dimnjača), <i>Cirsium arvense</i> (Palamia), <i>Matricaria chamomilla</i> (kamomilin), <i>Thlaspi arvense</i> (tlaspin njiva), <i>Papaver rhoeas</i> (Bulka), <i>Centaurea cyanus</i> (Njivski razlićak), <i>Stellaria media</i> (mišjakinja), <i>Lamium purpureum</i> (crvena kopriva) <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Hoću-neću), <i>Brasica napus</i> (Uljana repica), <i>Galium aparine</i> (Brođika), <i>Tripleurospermum inodorum</i> (bezmirisna kamilica), <i>Myosotis arvensis</i> (Sitnocvetni spomenak), <i>Galeopsis tetrahit</i> (smrdljiva kopriva).
Umereno osetljivi korovi:	<i>Polygonum aviculare</i> (Troskot), <i>Veronica arvensis</i> (kukuruzni vrtač), <i>Viola arvensis</i> (poljska ljubičica), <i>Veronica persica</i> (persijska veronika), <i>Apera spica-venti</i> (aperen kalliere), <i>Geranium pusillum</i> (zdravac).	<i>Polygonum aviculare</i> (Troskot), <i>Veronica arvensis</i> (persijska veronika), <i>Viola arvensis</i> (poljska ljubičica), <i>Veronica persica</i> (persijska veronika), <i>Apera spica-venti</i> (aperen kalliere), <i>Geranium pusillum</i> (zdravac).

Jara pšenica, jari ječam:

	individual use	use in a mixture with an adjuvant
Osetljivi korovi:	<i>Chenopodium album</i> (blagi labot), <i>Lamium amplexicaule</i> , (ciržen e arave), <i>Myosotis arvensis</i> (sitnocvetni spomenak), <i>Matricaria chamomilla</i> (kamomilin), <i>Papaver rhoeas</i> (bulka), <i>Stellaria media</i> (stellaren e ndërmjetme), <i>Lamium purpureum</i> (crvena kopriva) <i>Capsella bursa-pastoris</i> (hoću-neću), <i>Brasica napus</i> (uljana repica), <i>Galeopsis tetrahit</i> (smrdljiva kopriva), <i>Tripleurospermum inodorum</i> (bezmirisna kamilica), <i>Galium aparine</i> (Brođika), <i>Fallopia convolvulus</i> (njivski vijušac).	<i>Chenopodium album</i> (meki labot butë), <i>Lamium amplexicaule</i> , <i>Cirsium arvense</i> (Palamidin), <i>Myosotis arvensis</i> (Sitnocvetni spomenak), <i>Matricaria chamomilla</i> (kamomilin), <i>Papaver rhoeas</i> (bulka), <i>Mišjakinja</i> , <i>Lamium purpureum</i> (crvena kopriva) <i>Capsella bursa-pastoris</i> (hoću-neću), <i>Brasica napus</i> (uljana repica), (smrdljiva kopriva), <i>Tripleurospermum inodorum</i> (bezmirisna kamilica), <i>Galium aparine</i> (brođika).

5. KOLIČINA AMBALAŽE ZA UVOZ:

135g, 270g, 320g, 430g, 540g, 1080g, 2700g.

6. UPOZORENJE:

Ne zagađivati vode sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Ne čistite opremu za nanošenje u blizini površinske vode. Izbegavajte zagađenje sa farmi i puteva. Izbegavajte svako ispuštanje u životnu sredinu, osim za namensku upotrebu. Za zaštitu vodenih organizama potrebno je napraviti tampon zonu pokrivenu travom širine 5m od rezervoara i vodotoka. Za zaštitu ne ciljanih biljaka i zglavkara, posmatrajte neprskanu tampon zonu: 40 m od nepoljoprivrednog zemljišta, odnosno 20 m od ne poljoprivrednog zemljišta uz istovremenu primenu mera koje smanjuju raspršivanje rastvora za prskanje tokom tretmana sa 50% , odnosno 10 m od nepoljoprivrednog zemljišta uz istovremenu primenu mera, koje smanjuju raspršivanje rastvora za prskanje u toku tretmana za 75%, odnosno 5 m od nepoljoprivrednih zemljišta uz istovremenu primenu mera koje smanjuju raspršivanje prskanja. rastvora tokom lečenja sa 90%.

7. KARENCA:

Nema.

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS07- iritantan, iritirajući (cat 2 ili 3)



GHS09-upozorenje, opasno po životnu sredinu

9. MESTO PRODAJE: Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Proizvod za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26. stav 3 Zakona br. 03/L-042 o proizvodima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu na dan potpisivanja

Odluku dostaviti:

- *Komisiji za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja;*
- *Odeljenju za poljoprivrednu politiku i tržišta;*
- *Granična fito-sanitarna služba;*
- *AHV fito-sanitarni inspektori;*
- *Uvoznicima sredstava za zaštitu bilja;*
- *Arhivi.*



Faton Peci

Ministar