



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada - Government**

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural**  
**Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja**  
**Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

**Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister**

Datum: 08.08.2023  
Ref. KM-286/23

Na osnovu člana 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i samostalnih organa, (Službeni glasnik, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, aneks 11 Uredbe (NRC)-br.02 / 2021 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja, (Sl.list br. 44, od 22.12.2008.godine), kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenu i odobrenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-382/23, dana 31.07.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja doneo je:

**ODLUKU**

**Za upis u registar i odobrenje za upotrebu preparata za zaštitu bilja**

**1. Dozvoljava se uvoz, stavljanje u promet i korišćenje preparata za zaštitu bilja – Pilaround 360 SL proizvođača “Pilarquim (Shanghai) CO,LTD”,Kina od strane predstavnika „Agrimatco Kosovo L.L.C, Priština.**

**2. VRSTA PROIZVODA:** Herbicid

**3. SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE:** Glyphosate.....360g/L

**4. UPOTREBA:**

**Pilaround 360 SL**, kontroliše veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih trava, širokolisnih korova, drveća i žbunja na kultivisanom i neobrađenom zemljištu. Koristi se nakon nicanja korova na površini zemlje na voću i povrću, soji, orašastim plodovima, ječmu, pšenici, šećernoj trsci, sirku, travi za proizvodnju semena i dr. Koristi se i za suzbijanje korova u šumarstvu, vinogradarstvu u akumulacijama i za suzbijanje lisnih uši u jabukama, kruškama, trešnjama, bademima i šljivama. Za glavnu primenu nanesite glifosat od 20 do 60 litara vode po hektaru.

U ovim granicama koristi se pumpa koja raspršuje vrlo sitne čestice preparata kako bi se obezbedila adekvatna pokrivenost svih korova, uključujući i one ispod korova.

Primena:

Primena na terenu	Vrsta lošeg bilja	Razblaživanje	Doza (l/ha)
Agumi	Imperata cylindrica, Digitaria spp, Cyperus rotundus, Bidens pilosa	120- 170	4,0- 6,0
Polja pirinča	Imperata cylindrica, Eleusine indica, Rotala indica, Panicum repens, Digitaria spp, Paspalum conjugatum, Cyperaceae spp, Alternanthera(L), i druge osetljive biljke.	150- 180	4,3
Polje koje će biti pripremljeno za sadnju pirinča		130- 200	3- 4,5
Plantaže čaja	Brachiaria mutica, Cyperaceae spp, Imperata cylindrica, Polygonum, Paspalum conjugatum Paspalum dilatatum	100- 120	4,0- 5,0
	Cynodon dactylon, Panicum spp, Bothriochloa pertusa	80- 100	5,0- 6,0
	Druge vrste	70- 80	6,0- 7,0
Voćnjak krušaka	Brachiaria mutica, Cyperaceae spp, Imperata cylindrica, Polygonum, Paspalum conjugatum Paspalum dilatatum	100- 120	4,0- 5,0
	Cynodon dactylon, Panicum spp, Bothriochloa pertusa	80- 100	5,0- 6,0
	Druge vrste	70- 80	6,0- 7,0

**Zimski kupus**, maksimalna doza za jednokratnu upotrebu je 3,0 l/ha

Preporučena doza za jednokratnu upotrebu je 3,0 l/ha

Vreme primene treba da bude kada su korovi u fazi vegetacije sa intenzivnim razvojem. Preparat se koristi u ozimi uljane repice ili pšenice kada je vlažnost 20-30%, odnosno 10-14 dana pre sakupljanja semena. Da bi se postigao najbolji efekat za suzbijanje korova, tretiranje treba obaviti sedam dana pre završetka žetve. Da bi se olakšalo sakupljanje (za dobijanje suvog semena repice) preporučuje se kombinovanje grupe nakon 14-21 dana od datuma prskanja. Preporučena količina vode: 200-300 l/ha, maksimalni broj tretiranja tokom sezone 1.

**Ozima pšenica i uljana repica**, maksimalna doza za jednokratnu upotrebu je 4,0 l/ha, preporučena doza za jednokratnu upotrebu je 4,0 l/ha. Mere koje se primenjuju na korov počinju kada seme poraste od sredine avgusta do kasne jeseni. U vreme primene korov mora da dostigne visinu od 0-25 cm i da proizvede najmanje 3-4 potpuno razvijena izdanka, dok jednogodišnji korov mora biti visok najmanje 5 cm, a širok lisnati korov treba da razvije potpuno 2 lista. Preporučena količina vode: 200-300 l/ha, maksimalni broj tretmana u sezoni 1.

**Voćnjak jabuka**, maksimalna doza za jednokratnu upotrebu je 8,0 l/ha, preporučena doza za jednokratnu upotrebu je 3,0-8,0 l/ha. Primenu vršiti tokom intenzivnog rasta korova od proleća do jeseni u dozi neophodnoj za uništavanje različitih vrsta korova. Za uništavanje višegodišnjih korova (lišća) kao npr preslica se može koristiti u mešavini sa herbicidom Chwastox Extra sa dozom od 300 SL. Pilaround 360 SL 5.0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2.5 l/ha. Preporučena količina vode 200-300 l/ha, maksimalan broj tretmana u sezoni 1.

**Bašte, okućnice, prizemne površine oko kuće, prizemne površine između zgrada, pored ograda i drugih ograda, oko drveća, trotoari na spojnim i pristupnim putevima.**

Primenjuje se uglavnom od proleća do jeseni kada je toplo vreme i pogoduje razvoju korova. Da bi se delovalo na pravi sloj trave uglavnom u starom zemljištu, kopriivi ili drugim otrovnim travama, pre sadnje bašte ili parcele treba upotrebiti sredstvo Pilaround 360 SL. Maksimalna doza za jednokratnu upotrebu je 7,5 l/ha, preporučena doza za jednokratnu upotrebu je 5,0-7,5 l/ha. U slučajevima ponovljenih infekcija može biti potrebno ponoviti tretman, broj tretmana je 2, minimalni interval između tretmana je 21 dan. Tokom tretmana pokušajte da pravilno pokrijete zeleni deo korova. Da biste izbegli kontaminaciju ili curenje na susedne useve, koristite različite prekrivače. Posle tretmana izbegavajte hodanje po tretiranom području nekoliko sati i ne radite nikakve poslove najmanje nedelju dana. Ovo vreme je neophodno da se herbicid preseli pod zemlju do korova i da ih potpuno uništi. Nakon ovog vremena možete početi sa obradom tla i sadnjom. Rani radovi tj. ako se ne sačeka nedelju dana, onda se efikasnost preparata smanjuje. Preporučena količina vode 200-300 l/ha i maksimalan broj tretmana u sezoni 2.

#### **5. KOLIČINA AMBALAŽE ZA UVOZ:**

1L, 5L

#### **6. NAPOMENA:**

Ne koristiti kada korov još nije izbio na površini zemlje,

- na bolesne, mrtve ili oštećene biljke,
- tokom suše ili neprekidnih kiša,
- kada je temperatura noću niža od 5 stepeni.

#### **7. KARENCA:**

Nema

#### **8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:**



GHS07- iritantan, nadražujući (kategorija 2 ili 3)



GHS08-i štetno po zdravlje



GHS09- upozorenje (kategorija 1)-opasno po okruženje.

**9. PRODAJNO MESTO:** Na celoj teritoriji Republike Kosova.

**10.** Preparat za zaštitu bilja, odobren tačkom 1. ove odluke, dozvoljen je za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog sertifikatom o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU, dok je promet i upotreba dozvoljena prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 o proizvodima za zaštitu bilja.

**11.** Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

*Odluka se šalje:*

- *Komisiji za ocenjivanje i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departmanu poljoprivrednih politika i tržišta;*
- *Fitosanitarnoj graničnoj službi;*
- *FItosanitarnim inspektorima AHV;*
- *Uvoznicima preparata za zaštitu bilja*
- *Arhivi*

