



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA A KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVEILLIMIT RURAL
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT
Arkivi Dendro - Centralna Arhiva - Central Archive

Nr./Br./No. 801
Nr. i fq./Br. Str./No pg. 3+3+3
Data/Datum/Date: 01.03.2023
PRISHTINE PRISTINA PRISTINA

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

Kabineti i Ministrat / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 01.03.2023
Ref. KM-86/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrat dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – FONTELIS i prodhuesit “Corteva Agriscience.”, Bullgari nga përfaqësuesi i saj “Agroblend” Prishtinë.

2. LLOJI I PRODUKTIT: Fungicid

3. PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE: Pentiopyrad..... 200 g/lit

4. PËRDORIMI:

Në mollë, dardhë, ftua: Për luftimin e **Kromës** (Venturia inaequalis, Venturia pirina), **Hirit** (Podosphaera leucotricha), **Alternaria** (Alternaria spp.) dhe njollosjes kafe te dardhes (Stemphylium vesicarium) me dozë 75 ml/100 litra ujë. Në rast aplikimi deri në fund të lulëzimit, përdorni vëllim solucioni 1000-1200 litra/ha (750-900 ml produkt/ha). Respektoni intervalin minimal 7 ditë mes aplikimesh. Mund të kryeni 2 trajtime në sezon.

Në Pjeshkë, Nektarina, Kajsi, Kumbulla, Qershi: Për luftimin e **Kalbëzimit** (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola) dhe **Hirit** (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa) gjate fazës së lulëzimit kryeni 1 aplikim të vetëm me dozën 75ml/100 litra uje FONTELIS në solucion 500-1000 litra ujë; gjatë fazës së zhvillimit dhe maturimit të frutave, kryeni maksimumi 2 aplikime me dozën 1,5 l/ha produkt në solucion 500-1000 litra ujë. Respektoni intervalin minimal 7 ditë mes aplikimesh. Mund të kryeni 2 trajtime në sezon.

Në Hardhi: Për luftimin e **Hirit**, me dozë 75 ml/100 litra ujë. Në rast aplikimi deri në fund të lulëzimit, përdorni vëllim solucioni 1000-1200 litra/ha (750-900 ml produkt/ha). Respektoni intervalin minimal 7 ditë mes aplikimesh. Mund të kryeni 2 trajtime në sezon.

Domate, Patëllxhan: Për kontrollin e **Botritis** (Botrytis cinerea) dhe **Sklerotinia** (Sclerotinia spp.) Ne fushë të **hapur**, me dozën 2,4 l/ha FONTELIS në solucion 500-1200 litra ujë; kryeni 1 aplikim të vetëm në sezon; **Ne sera**, me dozën 2 l/ha FONTELIS në solucion 500-1000 litra ujë; kryeni maksimumi 2 aplikime në sezon, Respektoni intervalin minimal 5 ditë mes aplikimesh.

Spec (në sera): Për kontrollin e **Botritis** (Botrytis cinerea), me dozën 2 l/ha FONTELIS në solucion 500-1000 litra ujë; kryeni maksimumi 2 aplikime në sezon, Respektoni intervalin minimal 5 ditë mes aplikimesh.

Kungullore, Kastravec, pjepër, kungull, etj.: Për kontrollin e **Botritis** (Botrytis cinerea), **Hirit** (Sphaerotheca fuliginea), dhe **Sklerotinia** (Sclerotinia spp.) **Ne fushë të hapur**, me dozën 2,4 l/ha FONTELIS në solucion 500-1200 litra ujë; kryeni 1 aplikim të vetëm në sezon; **Ne sera**, me dozën 2 l/ha FONTELIS në solucion 500-1000 litra ujë; kryeni maksimumi 2 aplikime në sezon, Respektoni intervalin minimal 5 ditë mes aplikimesh.

Perime gjethore: **Sallatë, Spinaq, Lakër, Rukola, etj.:** Për kontrollin e **Botritis** (Botrytis cinerea) dhe **Sklerotinia** (Sclerotinia spp.) me dozën 1,5 l/ha FONTELIS në solucion 200-1000 litra ujë; kryeni 1 aplikim të vetëm në sezon;

Luleshtrydhe: Për kontrollin e **Botritis** (Botrytis cinerea) dhe **Hirit** (Sphaerotheca spp.), me dozën 1,75 l/ha FONTELIS në solucion 200-1000 litra ujë; kryeni maksimumi 2 aplikime në sezon, Respektoni intervalin minimal 5 ditë mes aplikimesh.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM: 10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1Lit

6. VËREJTJE:

Kujdes i veçantë do të tregohet për të evituar hedhjen e solucionit në bimët ngjitur ose në pellgje me ujë, vija uji, kanale ose objekte të tjera ujore sipërfaqësore. Kalibroni sprucatorët për të spërkatur vetëm nga afër. Mos aplikoni kur ka erë më të fortë se 15 km/h. Kur përdoret në temperaturatë nxehta, kalibroni sprucatorët të nxjerrin pikëla më të mëdhaja që të evitohet avullimi i shpejtë. Mos ndotni ujrat sipërfaqësorë me produktin ose kontainerët e përdorur. Mos derdhni në ujrat sipërfaqësorë ose në sistemet e kanalizimit të ujrave sanitare. Mos spërkatni në rast se shpejtësia e erës është mbi 15 km/h. Evitonit spërkatjen ose përdorimin e produktit në një distancë më të afërt se 20 m nga puset, vrimat e drenazhit, sistemet e hapura të kanalizimit ose vende ku uji i shiut që rrjedh nga vendet e trajtuar bashkohet me vija uji.

7. KARENCA:

Mollë, dardhë, ftua; **21 dite.**

Pjeshkë, Nektarina, Kajsi, Kumbulla, Qershi, Spec (në sera)Kungullore, Kastravec, pjepër, kungull, etj; **3 dite**

Në Hardhi; **5 dite**

Domate, Patëllxhan; **0**

Perime gjethore: Sallatë, Spinaq, Lakër, Rukola, Luleshtrydhe; **7 dite**

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS09- paralajmerim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.


10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pikë 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.



Vendimi i dërgohet:

- Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;
- Shërbimi kufitar fitosanitar;
- Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;
- Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Arkivit.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

Kabineti i Ministrave / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 01.03.2023
Ref. KM-86/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – FONTELIS of producer “Corteva Agriscience”, Bulgaria from its representative “Agroblend” Prishtinë shall be permitted.

2. **TYPE OF PRODUCT:** Fungicide

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Pentiopyrad..... 200 g/lit

4. **USE:**

In apple, pear, quince: To fight Venturia inaequalis, Venturia pirina, Podosphaera leucotricha, Alternaria spp. and Stemphylium vesicarium with a dose of 75 ml/100 liters of water. In case of application until the end of flowering, use a solution volume of 1000-1200 liters/ha (750-900 ml of product/ha). Respect the minimum interval of 7 days between applications. You can perform 2 treatments per season.

In Peaches, Nectarines, Apricots, Plums, Cherries: To fight Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola and Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa during the flowering phase, perform 1 single application with a dose of 75ml/100 liters of water FONTELIS in solution 500-1000 liters of water; during the phase of fruit development and maturation, perform a maximum of 2 applications with a dose of 1.5 l/ha product in a solution of 500-1000 liters of water. Respect the minimum interval of 7 days between applications. You can perform 2 treatments per season.

In grape vine: To fight against **Downy mildew**, with a dose of 75 ml/100 liters of water. In case of application until the end of flowering, use a solution volume of 1000-1200 liters/ha (750-900 ml of product/ha). Respect the minimum interval of 7 days between applications.

You can perform 2 treatments per season.

In Tomato, Eggplant: To control Botrytis cinerea and Sclerotinia spp.

In open field, with a dose of 2.4 l/ha of FONTELIS in a solution of 500-1200 liters of water; perform 1 single application per season;

In greenhouses, with dose of 2 l/ha FONTELIS in a solution of 500-1000 liters of water; perform a maximum of 2 applications per season. Respect the minimum interval of 5 days between applications.

In pepper (in greenhouses): To control Botrytis cinerea, with a dose of 2 l/ha FONTELIS in a solution of 500-1000 liters of water; perform a maximum of 2 applications per season. Respect the minimum interval of 5 days between applications.

In pumpkin, cucumber, melon, cucurbit, etc.: To control of Botrytis cinerea, Sphaerotheca fuliginea, and Sclerotinia spp. **In open field**, with the dose of 2.4 l/ha FONTELIS in solution 500 - 1200 liters of water; perform 1 single application per season; **In greenhouses**, with the dose of 2 l/ha FONTELIS in a solution of 500-1000 liters of water; perform a maximum of 2 applications per season. Respect the minimum interval of 5 days between applications.

In leafy vegetables: **Lettuce, Spinach, Cabbage, Arugula**, etc.: To control Botrytis cinerea and Sclerotinia spp. with a dose of 1.5 l/ha of FONTELIS in a solution of 200-1000 liters of water; perform 1 single application per season;

In strawberries: To control of Botrytis cinerea and Sphaerotheca spp., with a dose of 1.75 l/ha of FONTELIS in a solution of 200-1000 liters of water. Perform a maximum of 2 applications per season. Respect the minimum interval of 5 days between applications.

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT: 10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1Lit

6. REMARK:

Special care shall be taken to avoid splashing the solution on adjacent plants or in ponds, waterways, canals or other surface water bodies. Calibrate sprayer atomizer to spray at close range only. Do not apply when the wind is stronger than 15 km/h. When used in hot temperatures, calibrate sprayer atomizer to produce larger droplets to avoid rapid evaporation. Do not contaminate surface waters with the product or used containers. Do not pour into surface water or sanitary sewer systems. Do not spray if the wind speed is above 15 km/h. Avoid spraying or using the product closer than 20 m from wells, drain holes, open sewer systems or places where rainwater flowing from treated areas joins water lines.

7. KARENCA:

Apple, pear, quince, **21 days**.

Peach, nectarine, apricot, plum, cherry, pepper (*in green houses*) Pumpkin, Cucumber, melon, cucurbit, etc.; **3 days**

In grape vine; **5 days**

Tomatou, egg – plant, ; 0

Leafy vegetables: Lettuce, Spinach, Cabbage, Arugula, Strawberries; 7 days

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS09- warning (cat 1)-
environmental hazard

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.


10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.



The Decision shall be sent to the following:

- Commission on assessment and authorization of plant protection products;
- Department of Agriculture Policy and Trade;
- Phytosanitary boundary service;
- Phytosanitary inspectors VFA/PMO;
- Importers of plant protection products, and
- Archive



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivredne, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrave / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 01.03.2023
Ref. KM-86/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

O D L U K A

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – FONTELIS proizvođača „Corteva Agriscience.”, Bulgarska od svog predstavnika „Agroblend” Priština.

2. TIP PROIZVODA: Fungicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Pentiopyrad..... 200 g/lit

4. UPOTREBA:

Kod jabuke, kruške, dunje: Za suzbijanje šuge-hrome (Venturia inaequalis, Venturia pirina), pepela (Podosphaera leucotricha), alternarije (Alternaria spp.) i mrke pegavosti kruške (Stemphilium vesicarium) u dozi od 75 ml/100 litara vode . U slučaju primene do kraja cvetanja koristiti zapreminu rastvora od 1000-1200 litara/ha (750-900 ml proizvoda/ha). Poštujte minimalni interval od 7 dana između primena. Možete obaviti 2 tretmana po sezoni.

U breskvama, nektarinama, kajsijama, šljivama, trešnjama: Za borbu protiv truleži (*Monilia laka*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) i pepela (*Podosphaera tridactila*, *Sphaerotheca pannosa*) u fazi cvetanja izvršiti 1 jednokratnu primenu sa dozom od 105 l/l. vode FONTELIS u rastvoru 500-1000 litara vode; u fazi razvoja i sazrevanja ploda izvršiti najviše 2 primene sa dozom od 1,5 l/ha proizvoda u rastvoru od 500-1000 litara vode. Poštujte minimalni interval od 7 dana između primena.

Možete obaviti 2 tretmana po sezoni.

U vinovu lozu: Za borbu protiv **pepela**, sa dozom od 75 ml/100 litara vode. U slučaju primene do kraja cvetanja koristiti zapreminu rastvora od 1000-1200 litara/ha (750-900 ml proizvoda/ha). Poštujte minimalni interval od 7 dana između primena. Možete obaviti 2 tretmana po sezoni.

Paradajz, patlidžan: Za suzbijanje **botritisa** (*Botritis cinerea*) i **sklerotinia** (*Sclerotinia spp.*) na otvorenom, sa dozom od 2,4 l/ha FONTELIS-a u rastvoru od 500-1200 litara vode; izvršiti 1 pojedinačnu primenu po sezoni; **U plastenicima**, sa dozom od 2 l/ha FONTELIS-a u rastvoru od 500-1000 litara vode; izvršite maksimalno 2 primene po sezoni, Poštujte minimalni interval od 5 dana između primena.

Biber (u plastenicima): Za suzbijanje botritisa (*Botritis cinerea*), sa dozom od 2 l/ha FONTELIS-a u rastvoru od 500-1000 litara vode; izvršite maksimalno 2 aplikacije po sezoni, Poštujte minimalni interval od 5 dana između aplikacija.

Bundeva, krastavac, dinja, tikva i dr.: Za suzbijanje **botritisa** (*Botritis cinerea*), **pepela** (*Sphaerotheca fuliginea*) i **sklerotinia** (*Sclerotinia spp.*) na **otvorenom**, u dozi od 2,4 l/ha FONTELIS-a u rastvoru 500 -1200 litara vode; izvršiti 1 pojedinačnu primenu po sezoni; **U plastenicima**, sa dozom od 2 l/ha FONTELIS-a u rastvoru od 500-1000 litara vode; izvršite maksimalno 2 primene po sezoni, Poštujte minimalni interval od 5 dana između primena.

Lisnato povrće: zelena salata, spanać, kupus, rukola i dr.: Za suzbijanje **botritis** (*Botritis cinerea*) i **sklerotinia** (*Sclerotinia spp.*) sa dozom od 1,5 l/ha FONTELIS-a u rastvoru od 200-1000 litara vode; izvršiti 1 pojedinačnu primenu po sezoni;

Jagode: Za suzbijanje **botritisa** (*Botritis cinerea*) i **pepela** (*Sphaerotheca spp.*), sa dozom od 1,75 l/ha FONTELIS-a u rastvoru od 200-1000 litara vode; izvršite maksimalno 2 aplikacije po sezoni, Poštujte minimalni interval od 5 dana između primena.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOD:

10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1Lit

6. NAPOMENA:

Posebna pažnja će se posvetiti izbegavanju prosipanja rastvora na susedne biljke ili u lokvama vode, vodene puteve, kanale ili druga površinska vodna objekata.

Kalibrirajte prskalice da prskaju samo iz bliza.

Ne primenjivati kada je veter jači od 15 km/h.

Kada se koristi na visokim temperaturama, kalibrišite prskalice da proizvode veće kapljice kako biste izbegli brzo isparavanje.

Nemojte zagadivati površinske vode proizvodom ili korišćene kontejnere.

Ne sipajte u površinske vode ili sanitарне kanalizacione sisteme.

Ne prskati ako je brzina veta preko 15 km/h.

Izbegavajte prskanje ili upotrebu proizvoda na udaljenosti manje od 20 m od bunara, odvodni-drenažnih rupa, otvorenih kanalizacionih sistema ili mesta gde se kišnica teče iz tretiranih područja spaja sa vodenim vodovima.

7. KARENCA:

Jabuka, kruška, dunja; **21 dan**.

Breskva, nektarina, kajsija, šljiva, trešnja, paprika (u plastenicima) bundeva, krastavac, dinja, bundeva itd.; **3 dana**

U vinovoj lozi; **5 dana**

Paradajz, patlidžan; **0**

Lisnato povrće: zelena salata, spanać, kupus, rukola, jagode; **7 dana**

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.



Odluka se šalje:

- Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;
- Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;
- Fitosanitarna granična služba;
- Fitosanitarni inspektorji AHV / KP;
- Uvozniku srestava za zaštitu bilja;
- Arhiva.